

MODALITA' DI PREPARAZIONE PER:
Test al LATTOSIO,
LATTULOSIO (tempo di transito intestinale)
GLUCOSIO (contaminazione batterica intestinale)

OSSERVARE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI :

NELLE ULTIME 4 SETTIMANE

- Non bisogna eseguire Colonscopia, Clisma opaco, procedure di pulizia intestinale
- Non usare lassativi

NELLE ULTIME 2 SETTIMANE

- Non usare antibiotici

LA SETTIMANA PRECEDENTE

Sospendere l'uso di farmaci procinetici:

- Metoclopramide (Citroplus, Clopan, Metoclopramide cloridrato, Plasil, Pramidin, Randum, Geffer)
- Domperidone (Digestivo Giuliani, Domperidone Teva, Fobidon, Gastronorm, Motilium, Peridon)
- Bromopride (Procirex, Valopride)
- Alizapride (Limican)
- Levosulpiride (Levobren, Levopraid)
-

IL GIORNO PRECEDENTE

Escludere dalla dieta pane e pasta ed alimenti contenenti fibre alimentari non assorbibili (frutta e verdura), bevande gassate.

Cibi permessi: riso bollito condito con olio, carne o pesce bolliti o ai ferri.

IL GIORNO DELL'ESAME

Essere a digiuno, non aver fumato e non essersi sottoposto a sforzi fisici eccessivi da almeno otto ore, evitare di bere bevande gassate.

Il test si esegue al piano Terra presso il Laboratorio Analisi dal Lunedì al Venerdì entro le 8.30, bisogna accedere direttamente allo sportello accettazione senza prendere il numero. Per l'esecuzione dell'esame è necessario che il paziente resti a disposizione in struttura per circa 4 ore, verrà eseguito un prelievo basale prima di procedere al test completo per accertare la corretta esecuzione dello stesso.